

### Opgave 1

Til at beskrive byens restauranter, lad  $p$  være udsagnet (= propositionen) “maden er god”,  $q$  udsagnet “betjeningen er god” og  $r$  udsagnet “restauranten er tre-stjernet”. Skriv følgende udsagn ved brug af logiske symboler:

- (a) enten er maden god, eller betjeningen god, eller begge dele;
- (b) enten er maden god, eller betjeningen er god, men ikke begge dele;
- (c) maden er god og betjeningen dårlig;
- (d) det er ikke sandt, at maden er god og restauranten samtidig tre-stjernet;
- (e) hvis både maden og betjeningen er god, så er restauranten tre-stjernet;
- (f) det er ikke sandt, at en tre-stjernet restaurant altid har god mad og god betjening.

**Opgave 2** Med  $p$ : “stoffet er interessant”,  $q$ : “øvelserne er udfordrende”,  $r$ : “kurset er en fornøjelse”, skriv følgende udsagn symbolsk:

- a) stoffet er interessant og øvelserne er udfordrende;
- b) stoffet er uinteressant, øvelserne er ikke udfordrende, og kurset er ikke en fornøjelse;
- (c) hvis stoffet ikke er interessant og øvelserne ikke udfordrende, så er kurset ikke en fornøjelse;
- (d) at stoffet er interessant betyder, at øvelserne er udfordrende, og omvendt;
- (e) enten er stoffet interessant, eller øvelserne er ingen udfordring, men ikke begge dele.

**Opgave 3** Find sandhedstabellerne for følgende udsagn:

- (a)  $p \Rightarrow p$
- (b)  $(p \Rightarrow p) \vee (p \Rightarrow \neg p)$
- (c)  $(p \Rightarrow p) \Rightarrow (p \Rightarrow \neg p)$
- (d)  $(p \vee \neg q) \vee \neg p$
- (e)  $(p \vee \neg q) \Rightarrow \neg p$
- (f)  $(p \Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q))$
- (g)  $(p \Rightarrow (q \Rightarrow r)) \Rightarrow ((p \Rightarrow q) \Rightarrow (p \Rightarrow r))$

**Opgave 4** I et bestemt land taler folk enten altid sandt eller altid usandt. En turist kommer til et vej-Y, hvor den ene vej fører til hovedstaden, og den anden gør ikke. En indbygger står på stedet. Hvilket spørgsmål skal turisten stille for at få oplyst vejen til hovedstaden?

**Opgave 5** Omskriv følgende citater til symbolsprog, og beregn negationerne. Omskriv igen negationen til almindeligt sprog.

- (a) Det er aldrig overskyet hele dagen;
- (b) Mennesket lever ikke af brød alene;
- (c) Solen går aldrig ned over det britiske rige;
- (d) Enhver ting har sin tid, og der er et tidspunkt for ethvert forehavende.

**Opgave 6** Som i foregående opgave:

- (a) Ethvert positivt heltal har en entydig primfaktoropløsning;
- (b) det eneste hele primtal er 2;
- (c) multiplikation af hele tal er associativ;
- (d) to punkter i planen bestemmer en linie;
- (e) en trekants højder skærer i et punkt;
- (f) for en linie i planen og et punkt uden for denne, findes en entydig linie gennem punktet parallel med den givne linie.

**Opgave 7** Lad  $U \subseteq \mathbb{R}$  være en mængde,  $f: U \rightarrow \mathbb{R}$  en funktion, og antag, at der findes en konstant  $k \geq 0$ , således at

$$|f(x) - f(y)| \leq k|x - y| \quad \text{for alle } x, y \in U.$$

Vis, at  $f$  er uniformt kontinuert på  $U$ .

**Opgave 8** Lad  $I \subseteq \mathbb{R}$  være et åbent interval og  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  en differentiabel funktion med begrænset differentialkvotient. Vis, at  $f$  er uniformt kontinuert. (Vink: Benyt middelværdisætningen og opgave 7.)

**Opgave 9**

Lad  $(X, d)$  være et metrisk rum,  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  og  $g: X \rightarrow \mathbb{R}$  funktioner og  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Vi definerer funktionerne  $f + g$ ,  $\alpha f$  og  $fg$  ved

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) \quad \text{for alle } x \in X \quad (1)$$

$$(\alpha f)(x) = \alpha f(x) \quad \text{for alle } x \in X \quad (2)$$

$$(fg)(x) = f(x)g(x) \quad \text{for alle } x \in X. \quad (3)$$

Lad  $x_0 \in X$  og antag, at både  $f$  og  $g$  er kontinuerte i  $x_0$ .

1. Vis, at  $f + g$  og  $\alpha f$  er kontinuerte i  $x_0$ .
2. Vis ved hjælp af trekantsuligheden, at hvis  $x \in X$  er vilkårligt, så gælder

$$|f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)| \leq |g(x)||f(x) - f(x_0)| + |f(x_0)||g(x) - g(x_0)|. \quad (4)$$

3. Benyt 2. til at vise, at  $fg$  er kontinuert i  $x_0$ .

### Opgave 10

Lad  $(X, \tau)$  være et topologisk rum,  $f, g: X \rightarrow \mathbb{R}$  funktioner.

1. Generaliser opgave 9 fra metriske rum til topologiske rum.
2. Antag, at  $g$  er kontinuert i  $x_0 \in X$  og  $g(x) \neq 0$  for alle  $x \in X$ . Definer  $\frac{1}{g}: X \rightarrow \mathbb{R}$  ved

$$\left(\frac{1}{g}\right)(x) = \frac{1}{g(x)} \quad \text{for alle } x \in X. \quad (5)$$

Vis, at  $\frac{1}{g}$  er kontinuert i  $x_0$ . (Vink: Sæt på fælles brøkstreg!)

3. Antag yderligere, at  $f$  er kontinuert i  $x_0$ . Vis, at  $\frac{f}{g}$  er kontinuert i  $x_0$ .

### Opgave 11

Lad  $A \subseteq \mathbb{R}^2$  være mængden

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y < x^2 \quad \text{og} \quad 0 < x < 5\}.$$

1. Skitser  $A$  på en tegning.
2. Vis, at  $A$  er åben. (Vink: Man kan f.eks. vise, at der findes en passende kontinuert funktion  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  og åbne mængder  $B \subseteq \mathbb{R}$  og  $C \subseteq \mathbb{R}^2$ , så

$$A = f^{-1}(B) \cap C.$$

Man kan også argumentere ved hjælp af tegningen.)

3. Find randpunkterne for  $A$ .

### Opgave 12

Betragt mængden  $E \subseteq \mathbb{R}^2$  givet ved

$$E = \left\{ \left( x, \cos \frac{1}{x} \right) \mid x > 0 \right\}.$$

1. Skitser  $E$  på en tegning og sammenlign jeres tegning med side 51 i bogen (tegn først selv!).
2. Find randpunkterne for  $E$ .

### Opgave 13

Lad  $(a_n) \subseteq \mathbb{R}$  være en følge med  $a_n \leq a_{n+1}$  for alle  $n \in \mathbb{N}$ . Vis følgende:

- (i) Hvis  $(a_n)$  er opadtil begrænset, så vil  $a_n \rightarrow \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ .
- (ii) Hvis  $(a_n)$  ikke er opadtil begrænset, så vil  $a_n \rightarrow \infty$  for  $n \rightarrow \infty$ .

Det har derfor mening for en voksende følge  $(a_n)$  at skrive  $\lim_n a_n < \infty$  for at betegne, at følgen er konvergent i  $\mathbb{R}^n$ .

## Opgave 14

Lad  $(a_n) \subseteq \mathbb{R}$  og sæt  $s_k = \sum_{n=1}^k a_n$  for ethvert  $k \in \mathbb{N}$ . Vi siger, at den uendelige række  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  er konvergent, hvis følgen  $(s_k)$  er konvergent.  $s_k$  kaldes den  $k$ 'te afsnitsum for  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ .

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  kaldes absolut konvergent, hvis  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  er konvergent.

Vis, at hvis  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  er absolut konvergent, så er den konvergent. (Vink: Vis, at  $(s_k)$  er en Cauchyfølge)

## Opgave 15

Lad  $0 < p < 1$  og definer  $f: [0, \infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  ved:

$$f(x) = x^p \quad \text{for alle } x \geq 0.$$

Vis at  $f$  er uniformt kontinuert.

(Vink: Betragt intervallerne  $[0, 1]$  og  $[1, \infty[$  hver for sig. På  $[1, \infty[$  kan middelværdissætningen benyttes.)

## Opgave 16 (Sammenligningskriteriet for rækker)

1. Lad  $(a_n) \subseteq \mathbb{R}$ ,  $(b_n) \subseteq \mathbb{R}$  således at  $0 \leq a_n \leq b_n$  for alle  $n \in \mathbb{N}$ . Vis, at hvis  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  er konvergent, så er  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  konvergent.
2. Lad  $(a_n) \subseteq \mathbb{R}$ ,  $(b_n) \subseteq \mathbb{R}$ , således at  $|a_n| \leq b_n$  for alle  $n \in \mathbb{N}$ . Vis, at hvis  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  er konvergent, så er  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  absolut konvergent og dermed konvergent.

## Opgave 17 (kvotientkriteriet)

1. Lad  $a_n > 0$  for alle  $n \in \mathbb{N}$  og antag, at der findes et  $0 < q < 1$  og et  $n_0 \in \mathbb{N}$ , således at

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q \quad \text{for alle } n \geq n_0. \quad (6)$$

- Vis, at  $a_{n_0+k} \leq a_{n_0} q^k$  for alle  $k \geq 0$ .
- Vis, at rækken  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  er konvergent.

2. Lad  $a_n > 0$  for alle  $n \in \mathbb{N}$ , således at  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$ . Vis, at  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  er konvergent.

## Opgave 18 (Rodkriteriet)

1. Lad  $a_n \geq 0$  for alle  $n \in \mathbb{N}$  og antag, at  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} < 1$ . Vis, at  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  er konvergent. (Vink: Find en passende kvotientrække, som er en majorantrække for en "halerække" af  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ).
2. Bestem de  $x \in \mathbb{R}$ , for hvilke rækken  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n$  er absolut konvergent. (Vink: Benyt rodkriteriet. Der må benyttes (vises senere), at  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  er divergent).