

Eksaminatorier DM534

Studiegrupperne handler om at bruge hinanden til at arbejde med stoffet og sammen forsøge at løse ugens opgaver inden eksaminatorietimerne. I denne uge kræver opgave 6 en god idé, både til algoritmen og til argumentet for korrekthed, hvad det måske kan være godt at lede efter i fællesskab.

Husk at læse de relevante slides før du forsøger at løse en opgave.

Uge 41

1. Opskriv algoritmen Sequential Search ved hjælp af operationerne `readNext()`, `isEndOfFile()`, `open()` og `close()` fra interface't sekventiel tilgang.
2. Opskriv algoritmen for merge af to lister ved hjælp af operationerne `readNext()`, `isEndOfFile()`, `writeNext(data)`, `open()` og `close()` fra interface't sekventiel tilgang.
3. I denne opgaver repræsenterer vi mængder som sorterede lister uden dubletter. For eksempel vil de to mængder $A = \{5, 3, 9, 8\}$ og $B = \{3, 2, 9, 10, 27\}$ være repræsenteret som disse sorterede lister:

$$A = [3, 5, 8, 9]$$
$$B = [2, 3, 9, 10, 27]$$

Beskriv en algoritme til at beregne repræsentationen af foreningsmængden $X \cup Y$ ud fra repræsentationen af to mængder X og Y .

4. Beskriv en algoritme til at flette (merge) indholdet af tre sorterede lister A , B og C sammen til én sorteret liste D . Hvad er køretiden for din algoritme?

5. Givet en algoritme til at flette indholdet af tre sortererede lister A , B og C sammen til én sorteret liste D , beskriv en variant af Mergesort baseret på denne. Hvad er køretiden for din algoritme?
6. [Udfordrende] Beskriv en algoritme, der som input tager et tal K og to sortererede lister X og Y , hver med n tal, og finder ud af, om der findes et par af tal $x \in X$ og $y \in Y$ for hvilke $x + y = K$. Din algoritme skal køre i tid $O(n)$. Du skal argumentere for køretiden og for korrektheden af svaret (det sidste kan gøres med en invariant).
7. Hvis en hashfunktion h er givet ved $h(x) = x \bmod 11$, på hvilke pladser i tabellen ender tallene 25, 75, 125, 175?
8. Hvis en hashfunktion h er givet ved $h(x) = x \bmod 11$, hvor mange pladser i hashtabellen har mere end ét element, når der indsættes elementerne 34, 65, 122 og 155?
9. Beregn med lommeregner svaret på følgende: Hvis 3 elementer indsættes tilfældigt i et array med 7 pladser, hvad er sandsynligheden for, at der ikke er to elementer som ender på samme plads?
10. Beregn med lommeregner følgende svaret på følgende: Hvis 5 elementer indsættes tilfældigt i et array med 12 pladser, hvad er sandsynligheden for, at der ikke er to elementer som ender på samme plads?
11. Lav et Java-program med input n og k der for situationen hvor n elementer indsættes tilfældigt i et array med k pladser finder sandsynligheden for, at der ikke er to elementer som ender på samme plads.
12. Hvis 1000 elementer indsættes tilfældigt i et array med 1.000.000 pladser, hvad er sandsynligheden for, at der ikke er to elementer som ender på samme plads?
13. Hvis n elementer indsættes tilfældigt i et array med 1.000.000 pladser, hvor stor skal n være for at sandsynligheden for, at der ikke er to elementer som ender på samme plads, bliver mindre end $1/2$?